



സഞ്ജന്യം
നാട്ടിവുകൾ
ലഘുപുസ്തകം

പിന്നായപതിപ്പ്

മലയാള മണാലി

കർമ്മക്ക്ഷേ

നവാവർ 2001

Dr K. Pillai
Azolla Page 19 & 20

Pellet Making

കാലിത്തിറയ്ക്കു
ബദൽ അസോള

അന്നവിചാരം
മുന്നവിചാരം
കേരളത്തിന്റെ തെല്ലംകളിലുടെ

ചീല കൊതുകുതിരികൾ രാവത്രയും കിരുമും. എന്നാൽ സ്ഥലമത്രയും എത്തുമോ?

ഈതാ ഭ്യാതിലേബോട്ടറീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു—

കോൺഗ്രസ്സ് കോൺസ് എത്തുന്ന “മാക്സോ സെഫ്റ്റാതിൻ് കൊതുകുതിരി”



സാധാരണ കൊതുകുതിരികൾ



മാക്സോ കൊതുകുതിരി

സൗജന്യം



10/- രൂപ വിലയുള്ള
സെഫ്റ്റാതിൻ് മാക്സോ കൊതുകുതിരി
കോൺഗ്രസ്സ് കോൺസ് പ്രാബന്ധിക്കുന്നു

സാധാരണ കൊതുകുതിരികൾ എതാനും ചുറ്റുവട്ടം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചുഴലിക്കാറുപോലെ നിമിഷങ്ങൾക്കും മുറിയിൽ കോൺഗ്രസ്സ് കോൺസ് പ്രവർത്തിച്ച് കൊതുകുകളെ തുരത്തുവാൻ മാക്സോ സെഫ്റ്റാതിൻ് കൊതുകുതിരിക്കു മാത്രമെ കഴിയും. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഇൻസെക്ടിസെഡ്യ് ബോർഡ് അംഗീകൃത ഫോർമ്മുലയാണ് “മാക്സോ സെഫ്റ്റാതിൻ് കൊതുകുതിരി”

From the house of Jyothy Laboratories Ltd.

കാലിത്തീറയ്ക്കു ചെലവ്

ടി. കെ. സുനിൽ കുമാർ

'അസോള'യെന്ന ജലസസ്യം കന്നുകാലികൾക്കും കോഴിക്കും പോഷകസമ്പദം മായ തീറയാണെന്ന് കന്നുകുമാരിയിലെ 'നാർഡേപ്' കൈറ്റെതിൽ നടത്തിയ പരിക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. വിട്ടുവളർപ്പിൽ തന്നെ ഇതു വളർത്തിയെടുക്കാം. അതും കിലോയ്ക്ക് വെറും 85 പെസ ചെലവിൽ.

പ്രസ്താവന - കോഴി വളർത്തലുകാർക്ക് ഒരു സന്ദേശം വാർത്ത. ദിനംതോറും കുത്തനെ ഉയരുന്ന തീറച്ചുലവ് ഓർത്തെൻ നിങ്ങൾ ഇനി വിശദിക്കേണ്ട്. 'അസോള'യെന്ന ജലസസ്യം കന്നുകാലിക്കും കോഴിക്കും പോഷകസമ്പദമായ തീറയാണെന്ന് കന്നുകുമാരിയിലെ 'നാർഡേപ്' സാങ്കേതിക വിദ്യാക്കേഡറ്റതിൽ നടത്തിയ പരിക്ഷണ ഓർത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. വിട്ടു വളർപ്പിൽ തന്നെ ഇതു വളർത്തിയെടുക്കാം. അതും കിലോയ്ക്ക് വെറും 85 പെസ ചെലവിൽ.

കന്നുകുമാരി വിവേകാനന്ദ കൈറ്റെതിലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സെൻററിൽ ഡേഡ. പി. കമലാസനൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗവേഷണത്തിലാണ് അസോള നല്ലാരു കാലിത്തീറയാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടത്. കരവപ്പുവിശേഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ തീറയിൽ രണ്ടു കിലോഗ്രാമോ

അസോള വളർത്തുന്ന വിധം



തടക്കുത്ത് ആദ്യം പഴയ ഫ്രാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ വിരിക്കുന്നു.



അതിനു മേലെ സിൽഫാളിൽ ചീറ്റു വിരിക്കുന്നു.



കുറിനു മേലെ മുള്ള് നിരത്തുന്നു.



ശുശ്രാവമൊഴിക്കുന്നു.



ചാണകവെള്ള് തടക്കിലേക്ക്



തടത്തിൽ വളർന്നു നിന്നുന്ന അസോള



അരിപ്പയിൽ അസോള കോരിയെടുക്കുന്നു

കുറഞ്ഞ ബദൽ



ചീരു പാക്കാതെ വർഷങ്ങളിൽ കല്ലോ ഇഷ്ടികയോ ചേർക്കുന്നു



ചാണകവെള്ളത്തിൽ വളം(ഫെർട്ട് മിക്സ്) ചേർക്കുന്നു



കുട്ടതൽ
വഭളമാഴിക്കുന്നു



തകതിൽ അസോള കൾച്ചർ വിതരുന്നു



വഭളത്തിൽ കഴുകിയടക്കുന്നു



കാലിത്തിറയുമായി കലർത്തുന്നു



മിശ്രിതം പശുവിനു തിറ്റ

അസോള നല്ല ജൈവവള്ളം

ശ്രദ്ധജലാത്തിൽ വളരുന്നതും കാഴ്ചയിൽ പായലെന്നു തോന്തി കുന്നതുമായ പനലാണ് അസോള. നല്ലാരു ജൈവവള്ളംായി അസോളയെ പണ്ണേം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇലമടക്കുകളിൽ അഡയം തേടി വളരുന്ന തീലഹരിത പായലാണ് അസോളയെ പോഷക സമൂഖംമാക്കുന്നത്. അഡയം, നൽകുന്നതിനു പ്രത്യും പകാരമായി ഈ പായൽ അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നു എന്തെങ്കിൽ വലിച്ചെടുത്ത് അസോളയ്ക്കു നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അസോള വളരെപ്പെടുത്തുന്ന വളർന്നു പെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൊത്തം വരു ഏടകത്തിൻറെ 50% മാനസ്യവും വളരു കൂടിയ അളവിൽ ഇരുന്ന്, കാശ്യം, മൾനീസ്പും, പൊട്ടാഷ് എന്നി ധാതുവാൺങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. വെറുമിൻ, അമിനോ അസ്ഥാഞ്ചി തുടങ്ങി കാലികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പാലുൽപാദനത്തിനും, വേണു എല്ലാ ഏടകങ്ങളും ഇതിലുണ്ടെന്ന് നാർഡൈപ്പും, സി.എഫ്.റി.ആർ.എഫ്യൂം ചേർന്നു നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെതായി ദിവേഷണസംഘത്തിലെ എസ്. രാജാമണി പറഞ്ഞു. ഇതിലെ ആൺൻ ഓക്സിഡന്റുകളും ബിറ്റം കണ്ണാടിനും പാലജുവും കരവക്കംലബവും കുട്ടാനുപകരിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകം: റോബർട്ട് വിനോദ്

എ. അസോളു ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പാലി സീറ അളവ് 15-20% വരെ വർധിച്ചതായി കന്യാകുമാരിയിലും. കൊല്ലുത്തും. നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ കണക്കന് ഡോ. പി. ഒള വ്യക്തമാക്കുന്നു. പശുവിനും. കോഴിക്കും. മാത്രമല്ല, അട്ടക്, പനി, മത്സ്യ. എന്നിവയ്ക്കും മുതു ഗുണമേന്തുള്ള തീറ്റയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


അസോള ഫ്രെഞ്ചേന വളർത്താ.

അസോള ജൈവ വളർത്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വയലിൽ വളർത്താം. ഏന്നാൽ വളർച്ചാ നിർക്ക് ദിനത്തോറും ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വെറും 50 ശ്രാ. മാത്രമായിരിക്കും. തീറ്റയ്ക്കായി വളർത്തുന്നോൾ വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടുതലാരം വളർത്തണം. സിൽപാളിയിൽ അബ്ലൂഷിൽ പോളി ഷിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുവളർപ്പിൽ തന്നെ അസോള വളർത്തുന്ന റിതി 'സാർഡീൻ' ഉത്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ രീതിയിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ 300-350 ശ്രാ. വരെ ദിനപ്രതി വളർച്ചയുള്ളതായി കാണുന്നു.


മരത്തണ്ണലിൽ ഒഭു മീറ്റർ നീളം, ഒരു മീറ്റർ വിതി, 20 സെ.മീ. ആഴത്തിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിൽ തടമെടുക്കുകയാണ് ആദ്യപട്ടി. തെങ്ങിൽ ചുവട്ടിലും, തടമെടുക്കാം. തടത്തിൽ പഴയ പൂശ്ചിക്ക് ചംക്കുകൾ വിതുക്കുക. അതിനുമുകളിൽ മീറ്റർ നീളം 2.8 മീ. നീളവും, 1.8 മീ. വിതിയും 120 ശേഖരിക്കുവും ഒരു സുചിരമില്ലാത്ത പുതിയ സിൽപാളിയിൽ ഷിറ്റ് ചുഡ്യുകൾക്കിടയിൽ നിവർത്തി വിരക്കുക. ഷിറ്റ് പരക്കാതിരിക്കാൻ വശങ്ങളിൽ ഇഷ്ടിക വയ്ക്കാം. നട്ടുവളക്കുറുള്ള 10-15 കിലോ മണ്ണ് ഷിറ്റിൽ ഒരേ കനത്തിൽ നിരത്തുക. പത്തു മീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒഭു കിലോഗ്രാം ചാണകവും, മുപ്പതു ശ്രാ. അസോള മിക്ക് അബ്ലൂഷിൽ റോച്ചപ്പോസ്റ്റേറും. കലർത്തിയത് മണ്ണിലേക്ക് ശിക്കുക. ജലനിറപ്പ് പത്തു സെ.മീ. ഉയരത്തിലുംകുന്നതു വരെ പിന്നെയും. വെള്ളമൊഴിക്കണം. അതിലേക്ക് 500 ശ്രാ. മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ അസോള കൾ ചുർഖന്നു. ഒഭുച്ചായ്ക്കു. മുതു തട. നിരയിൽ വളർന്നു പടരും. അതിനു ശേഷം, ഓരോ ദിവസവും, 500-600 ശ്രാ. അസോള ഉപയോഗത്തിനായി എടുത്തു മാറ്റാം.

തീറ്റ നൽകുന്ന റിതി

ഒരു ചതുരശ്ര സെ.മീ. വിസ്താരം, വരുന്ന പൂശ്ചിക്ക് അബിപ്പിയിൽ അസോള കോൺ ദയടക്കുക. അതിനുശേഷം, ഒരു സ്വകൾ റിതി ശുശ്വജലത്തിൽ സുചിച്ചിച്ചിക്കുന്ന, വലിയ കണ്ണുകളുള്ള(3x3 സെ.മീ.) പുംസറ്റിക് അബിപ്പിയിൽ മുട്ടു കുടുക്കുക. ചംക്കത്തിനെന്ന് മണവും, അംഗവും, മറ്റും സ്സ്യാവശിഷ്ടങ്ങളും, മാറിക്കുട്ടും, അബിപ്പി



അസോള കോഴിക്കും തീറ്റ്



പെട്ടോസിമൻറ് ടാക്കിലും അസോള വളർത്താ.

വകര്ഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഉയരത്തുനോൾ വലിയ അസോള മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവും. സ്വകൾ റിതി ശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ ചെടികൾ അസോളത്തിലില്ലെങ്കിൽ റിതിക്കുക. ഷിറ്റ് മിക്സും, ഉണ്ട്. അസോളയുടെ ധാരകിലെ മർന്നിഷ്യും, അയൽ, കോം സൽഫർ തുടങ്ങിയ സുകഷ്മ മുലക്കുടെ മിശ്രിതം. ആദ്യചതോറും നൽകുക.

കുർക്കരുതൽ

- തന്മാലിലെ വളർത്താവും, സൂര്യപ്രകാശനേം നേരിട്ടു പതിക്കാൻ പാടില്ല.



ഡോ. പി.കമലാസനൻ പിള്ള 'സാർഡീൻ' ലെ അസോള കുഴിയിട്ടിൽ

തൽ കന്നുകാലിക്കും. ആട്ടക്കാലിക്കും പനിക്കും. നൽകാം. രൂചി പ്രചൂടുകൾ കണ്ണിലെ ലിക്കർ അസോള മാത്രമായി നിന്നും. ഒരു കന്നുകാലിക്ക് ദാഡിൽ ദിവസം നാലു കിലോ മും. മഴക്കാലത്ത് മുന്നു കിലോ ശാമുമേ പരമാവധി നൽകാം. വളർത്തു മംസ്യങ്ങളിൽ ദാഡി വർക്കർപ്പും ശാസ്ത്ര കാർഡിയും മുതു നന്നായി തിന്നും. ടാബ്ലേറുകൾ വിതരിയാൽ മതി.

കോഴിക്ക് സ്റ്ററ്റർ തിരുവന്നടിയിലും, പിനിപ്പിൽ തിരുവന്നടിയിൽ ചേരേതോ കൊടുക്കാം. മുതു നെടുത്താൽ കോഴിത്തിരുവന്നടിയുടെ ആളവ് വരെ കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് പഠനമെല്ലാം.

വളപ്രയോഗം

എഴു ദിവസം, കുടുമ്പോൾ ഒരു തന്മാലിലെ കിലോഗ്രാം ചാണകവും 20 ശ്രാ. അസോള മാർക്കറ്റ് മിക്ക് അബ്ലൂഷിക്കിൽ ദേഹപ്പോസ്റ്റേറും. നൽകണം. നാർഡീൻ തന്മാലിലെ ചെയ്യുന്ന അസോള കിറ്റിൽ മുക്ക് മിക്സും, ഉണ്ട്. അസോളയുടെ ധാരകിലെ മർന്നിഷ്യും, അയൽ, കോം സൽഫർ തുടങ്ങിയ സുകഷ്മ മുലക്കുടെ മിശ്രിതം. ആദ്യചതോറും നൽകുക.

കുർക്കരുതൽ

- തന്മാലിലെ വളർത്താവും, സൂര്യപ്രകാശനേം നേരിട്ടു പതിക്കാൻ പാടില്ല.

- തട. നല്ല നിർപ്പുയിലും നാം. പത്തു സെ.മീ. തന്മാലിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള, ഉണ്ടായിരിക്കണം.

- ഇടയ്ക്കിട്ടു പി.എച്ച്.എൽ. ലൈ, നോക്കി 5.5-7 പരിപാലണന്ന് ഉറപ്പുകും.

- തിങ്കി വളരുന്നത് ചെടുക്കാൻ ദിവസവും, കുറഞ്ഞും 300-350 ശ്രാ. അസോള തന്മാലിലെ മാറ്റണം.

- പേരഷക്കുവിവരം പരിഹരിക്കണം. കുറഞ്ഞും, രേഖാഗ്രാഫും. കുറഞ്ഞും പരിഹരിക്കാം. വെളകരുതൽ

- മാസത്തിലൊരിക്കുന്ന തന്മാലിൽ നിന്ന് അബിപ്പി ശ്രാ. മണ്ണും മാറ്റി അതെ തുമണ്ണും ഇടണം. നെറ്റാം. അമിതമാകുന്ന ശിവാകാനാണിൽ. ലും, രണ്ടാം. കുടുമ്പോൾ മുന്നിലെ വെള്ളവും മാറ്റി അബിപ്പി ശ്രാവജലം. ഒരു കണ്ണും മറ്റും. നല്ലും. വെള്ളവും. കണ്ണിക്കും. മറ്റും. നല്ലും.